



แบบรายงานตัวชี้วัดคุณภาพบริการคลินิกเบาหวาน

ลำดับที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าเฉลี่ย 2552
1	อัตราของระดับ Fasting blood sugar ในผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (≥ 70 mg/dl และ ≤ 130 mg/dl)	≥ 40	37.76
2	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C ประจำปี	≥ 80	63.35
3	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C น้อยกว่า 7%	≥ 40	33.22
4	อัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน	≤ 5	3.02
5	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid Profile ประจำปี	≥ 90	71.19
6	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับไขมันตามเป้าหมาย (LDL < 100 mg/dl)	≥ 70	43.59
7	อัตราของระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ำกว่าหรือเท่ากับ 130/80 mmHg	≥ 70	33.32
8	อัตราผู้ป่วยเบาหวานอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ได้รับยา Aspirin	≥ 50	65.88
9	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ประจำปี	≥ 90	30.30
10	อัตราผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACE Inhibitor หรือ ARB	≥ 90	40.37



(ต่อ) แบบรายงานตัวชี้วัดคุณภาพบริการคลินิกเบาหวาน

ลำดับที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าเฉลี่ย 2552
11	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี	≥ 90	60.97
12	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี	**	39.69
13	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี	≥ 40	50.77
14	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า	≤ 10	1.61
15	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า เท้าหรือขา	0	10.30
16	อัตราของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง หรือผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	100	57.04
17	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ที่ได้รับคำแนะนำปรึกษาให้เลิกบุหรี่	100	31.62
18	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic retinopathy	**	8.03
19	อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic Nephropathy	**	14.75
20	อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง Impaired Fasting Glucose (IFG)	**	4.86

ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง จำนวน 9 โรงพยาบาล, ปี 2552